

РАС

(расстройство аутистического спектра)

термин, используемый для описания группы расстройств развития центральной нервной системы

К ним относятся: ранний детский аутизм, атипичный аутизм, аутизм Каннера, высокофункциональный аутизм, первазивное расстройство развития без дополнительных уточнений, детское дезинтегративное расстройство и синдром Аспергера.

Первые признаки можно наблюдать в раннем возрасте от 2 месяцев, и ярко выраженными становятся к 3 годам.

Эти расстройства проявляются главным образом нарушениями в трех сферах:



Общение – трудности в установлении и поддержании социальных контактов с взрослыми и детьми.
Поведение – своеобразие, ограниченность и стереотипность интересов и деятельности (выстраивание предметов в ряд, однотипные действия с предметом: крутит, стучит и т.д.).
Речь – задержка ранних этапов речевого развития (гуления, лепета, слов, фраз).

Если ваш ребенок:

- Не смотрит в глаза
- Не отзывается на имя
- Не улыбается в ответ на улыбку
- Не использует жесты
- Не говорит
- Не привлекает внимание взрослого к интересующему предмету
- Не следит за указательным жестом взрослого
- Совершает повторяющиеся движения (раскачивается, машет руками и т.п.)
- Не любит нового, тяжело переносит перемены
- Ограниченно играет с игрушками (выстраивает в ряд, играет с отдельными частями: крутит колесико у машинки)

А также, Вы можете самостоятельно пройти скрининговый тест на аутизм для определения группы риска вашего ребенка М-CHAT (16-30 месяцев) на сайте «Фонд Выход»: <https://outfund.ru/>.

**При получении результатов, указывающих на риск РАС,
Необходимо обратиться к специалистам!**

Педиатр
Невролог
Психолог
Воспитатель
Дефектолог
Логопед
Социальный работник

} Могут заметить симптомы РАС

Психиатр – подтверждает клинический диагноз!